



Ultrasounds During Pregnancy

During pregnancy, an ultrasound is a procedure that uses high-frequency sound waves to look at the stomach and pelvic area. It creates a picture of your baby and placenta—called a sonogram. Ultrasounds are done only for medical reasons.

There are 2 main types of ultrasounds:

1. Transvaginal ultrasound:

A wand-like device called a **transducer** is placed in your vagina to gather information on your baby. It is used during your first trimester (before 14 weeks) or later if needed to measure the length of your cervix.

2. Transabdominal ultrasound:

This is done by moving the transducer over your stomach.

There are 3 routine times that an ultrasound will be done:

1. First Trimester (first 12 weeks):

To check if the pregnancy is viable and to determine the due date of your baby. This is ideally done between 7-9 weeks. This is usually done at Erie.

2. Around 20 weeks:

To check the development of your baby. The sex of the baby can be known at this ultrasound. This will be done at your delivery hospital.

It is very important that you call and schedule this ultrasound appointment at the hospital as soon as your provider makes the referral and you receive it. Our hospital partners often are scheduling out many weeks.

3. At 36 weeks:

To check the position of the baby. This is usually done at Erie.

Additional ultrasounds may be needed if you have certain medical conditions, to check position of the baby, or are past 41 weeks of pregnancy. If an ultrasound is needed to check the growth of your baby, this will happen at a hospital.

The fastest way to get your hospital ultrasound referral is to sign up for the patient portal. Ask the Front Desk to set up your login.





Ultrasonidos durante el embarazo

Durante el embarazo, el ultrasonido es un procedimiento que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar el estómago y la zona pélvica. Crea una imagen del bebé y la placenta, llamada ecografía. Los ultrasonidos se realizan únicamente por motivos médicos.

Hay dos tipos principales de ultrasonidos:

1. Ultrasonido transvaginal:

Se coloca en la vagina un dispositivo parecido a una varita, llamado **transductor**, para obtener información sobre su bebé. Se utiliza durante el primer trimestre (antes de las 14 semanas) o más después si es necesario para medir la longitud del cuello uterino.

2. Ultrasonido transabdominal:

Se realiza moviendo el transductor sobre el estómago.

La forma más rápida de obtener el referido para el ultrasonido en el hospital es inscribirte en el portal del paciente. Pide a la recepción que configure tu acceso.



Hay tres momentos rutinarios en los que se realiza un ultrasonido:

1. Primer trimestre (primeras 12 semanas):

Para comprobar si el embarazo es viable y determinar la fecha de parto de tu bebé. Lo ideal es hacerlo entre las 7 y 9 semanas. Suele hacerse en Erie.

2. Alrededor de las 20 semanas:

Para comprobar el desarrollo del bebé. En este ultrasonido se puede conocer el sexo del bebé. Se hará en su hospital de parto.

Es muy importante que llames y programes esta cita para el ultrasonido en el hospital tan pronto como tu proveedor haga el referido y lo recibas. Los hospitales asociados con nosotros suelen programar con muchas semanas de anticipación.

3. A las 36 semanas:

Para comprobar la posición del bebé. Esto se suele hacer en Erie.

Pueden ser necesarias otros ultrasonidos si tienen ciertas condiciones médicas, para comprobar la posición del bebé o si ya ha pasado la semana 41 de embarazo.

Si se necesita un ultrasonido para comprobar el crecimiento de tu bebé, se hará en un hospital.